

NOTICE

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

1.1 Dénomination

TISANE MEDIFLOR N°3 DIGESTIVE, mélange de plantes pour tisane en sachet-dose

1.2 Composition qualitative / Composition quantitative

FENOUIL DOUX (fruit)	0,324 g
ANGELIQUE (fruit)	0,306 g
CORIANDRE	0,306 g
MENTHE POIVREE (feuille).....	0,306 g
ROMARIN.....	0,288 g
AUNEE	0,270 g

pour un sachet-dose de 1,80 g

1.3 Forme pharmaceutique

Mélange de plantes pour tisane en sachet-dose.

1.4 Classe pharmaco-thérapeutique

Médicament de phytothérapie

1.5 Nom et adresse de l'exploitant

Titulaire

LABORATOIRES MEDIFLOR
37, RUE ST ROMAIN
69008 LYON

Exploitant

MERCK MEDICATION FAMILIALE
18C boulevard Winston Churchill
21070 DIJON

Fabricant

SPPH L'ISLE D'ABEAU
Parc de Chesnes
40, rue de la Garenne
38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Traditionnellement utilisé pour faciliter la digestion.

3. ATTENTION

3.1 Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament ?

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

3.2 Mises en garde spéciales

Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

3.3 Précautions d'emploi

Néant.

3.4 Interactions médicamenteuses et autres interactions

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

3.5 Grossesse - Allaitement

Néant.

3.6 Conducteurs et utilisateurs de machines

Néant.

3.7 Sportifs

Néant.

3.8 Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Néant.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

4.1 Posologie

Voie orale. Réservé à l'adulte.

1 ou 2 tasses par jour.

Utiliser 1 sachet-dose en infusion, par tasse d'eau bouillante.

4.2 Mode et voie d'administration

Porter de l'eau à ébullition et la verser sur le sachet-dose, couvrir et laisser infuser pendant 10 à 15 minutes; puis retirer le sachet-dose.

La tisane doit être préparée au moment de l'emploi.

4.3 Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Néant.

4.4 Durée du traitement

Néant.

4.5 Conduite à tenir en cas de surdosage

Néant.

4.6 Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Néant.

4.7 Risque de syndrome de sevrage

Néant.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, TISANE MEDIFLOR N°8 PEC TORALE D'ALSACE, plantes pour tisane en sachet-dose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

6. CONSERVATION

6.1 Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

Néant.

6.2 Précautions particulières de conservation

Conserver à l'abri de l'humidité et à une température inférieure à 25°C.

6.3 Mise en garde en cas de signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

OCTOBRE 2002